

A photograph of two men standing in a vast agricultural field at sunset. The man on the left, wearing a straw hat and a plaid shirt, is gesturing with his right hand towards the horizon. The man on the right, wearing a dark shirt and a watch, is looking at the plants. The field is filled with rows of green crops, and the sky is a warm, golden color.



Cambiar para seguir estando aquí a mano

La línea de soluciones de protección de cultivos de Tradecorp ahora forma parte del portfolio de Selectis Agro. Las mismas soluciones que te han acompañado durante los últimos 25 años, te acompañarán con la misma calidad, y seguirás teniendo a Selectis Agro aquí a mano.

selectis
AQUÍ A MANO

Porque tus cultivos merecen lo mejor del campo. Te presentamos nuestra línea de productos.

En este catálogo de Selectis Agro encontrarás una amplia selección de productos diseñados para satisfacer todas tus necesidades. Contamos con un portafolio completo que abarca categorías esenciales como herbicidas, fungicidas, insecticidas, cada uno desarrollado bajo los más altos estándares de calidad e innovación. **Con Selectis Agro, siempre encontrarás la solución perfecta para proteger y optimizar tus cultivos.**



selectis
AQUÍ A MANO





Herbicidas

Conoce toda nuestra línea de productos para esta categoría.



Admeto[®]

Herbicida selectivo que controla eficazmente un amplio rango de malas hierbas anuales de hoja ancha y algunas gramíneas en pre-emergencia o post-emergencia muy precoz en estado menor de 2 hojas.

Pendimetalina 33%, EC

ES-00490

Bayasant[®] WG

Herbicida residual y sistémico sin plazo de seguridad para el control de una amplia variedad de gramíneas anuales y perennes y malas hierbas de hoja ancha.

Flazasulfuron 25%, WG

ES-01574

Catcher[®]

Herbicida selectivo para el control de malas hierbas de hoja ancha anuales y perennes.

Fluroxipir 20%, EW

ES-01188

Bentador[®]

Herbicida selectivo y de contacto indicado para el control de malas hierbas ciperáceas y dicotiledóneas.

Bentazona 48%, SL

25575

Bayasant[®] Duo **NEW**

Herbicida sistémico, preventivo y beneficioso para el control de malas hierbas gramíneas y dicotiledóneas en olivo (de almazara y de verdeo).

Flazasulfuron 3% +
Iodosulfuron-metil-sodio 1%

ES-01836

Extensor[®] OD

Herbicida exclusivo de maíz en formulación oleosa. Óptimo control malas hierbas dicotiledóneas incluso resistentes.

Nicosulfuron 2% Sulcotriona 15%, OD

ES-00111



Herbicidas

Gal-Gone[®]

Herbicida sistémico para el control de malas hierbas de hoja ancha (dicotiledóneas) en post-emergencia. No residual.

Fluroxipir 20%, EC

25462

Mamut[®] Max

Herbicida selectivo de cereales con dos modos de acción diferentes y complementarios. Amplio espectro de actividad y eficacia.

Diflufenican 40%
Florasulam 2%, WG

ES-01238

Hormotrade[®] 50

Herbicida sistémico de post-emergencia con eficacia superior en el control de malas hierbas de hoja ancha.

MCPA (sal dimetilamina) 50%, SL

22720

Mamut[®]

Herbicida de posición y acción por contacto con gran eficacia frente a malas hierbas dicotiledóneas en pre-emergencia o post-emergencia muy precoz.

Diflufenican 50%, SC


24239

Inteike[®]

Herbicida selectivo con buena persistencia de acción. Controla malas hierbas anuales dicotiledóneas y monocotiledóneas.

Oxifluorfen 24%, EC

23047



Moory®

Herbicida de cereales para control de hoja ancha y gramíneas. Actúa muy eficazmente sobre meristemas en crecimiento de las malas hierbas objetivo.

Diflufenican 4% 25900
Pendimetalina 40%, SC

Oteador®

Herbicida de post-emergencia con acción sistémica y una gran actividad herbicida presentado en forma de microgránulos solubles.

Tribenuron-metil 75%, WG ES-01087

Patter® Green 36

Herbicida sistémico no residual contra malas hierbas anuales, vivaces y perennes en post-emergencia.

Glifosato (sal IPA) 36%, SL ES-00599

Nicozea®

Control eficaz de malas hierbas gramíneas anuales y vivaces en post-emergencia precoz. Acción herbicida sistémica con traslocación por el floema y xilema.

Nicosulfuron 4%, OD 24899

Overstar®

Herbicida selectivo y sistémico de gran versatilidad con alta eficacia contra malas hierbas de hoja ancha en el cultivo del cereal.

Florasulam 5%, SC ES-01155

Pearly® 80

Herbicida de aplicación pre o post emergencia temprana en trigo y cebada de invierno.

Prosulfocarb 80%, EC ES-00293



Radar[®]

Herbicida selectivo anti-gramíneo de sistemía completa y acción en post-emergencia temprana. Penetra rápidamente en las malas hierbas sensibles.

Quizalofop-p-etil 5%, EC

24515

Rimsur[®]

Herbicida sistémico de post-emergencia para patata, tomate y maíz. Controla eficazmente malas hierbas gramíneas y dicotiledóneas en post-emergencia.

Rimsulfuron 25%, WG

ES-00246

Wildcard[®]

Herbicida de acción sistémica y de amplio espectro contra malas hierbas de hoja estrecha y hoja ancha.

Clomazona 36%, CS

ES-00671

Radar[®] Plus

Herbicida sistémico anti-gramíneo de post-emergencia. Se traslada a través de la savia a los meristemos apicales y puntos de crecimiento.

Fluazifop-p-Butil 12,5%, EC

24772

Sulcotrina[®]

Herbicida de maíz especialista en el control de juncia y dicotiledóneas resistentes.

Sulcotrina 30%

24898

Zeatryn[®]

Herbicida de maíz en post-emergencia para el control de dicotiledóneas resistentes y juncia.

Mesotriona 10%, SC

ES-00529

He







Fungicidas

Conoce toda nuestra línea de productos para esta categoría.



Azufril[®] MG ECO

Fungicida anti-oídio de acción preventiva y curativa.

Azufre 80%, WG 24136

Boltex[®] C

Antimildiu sistémico y de contacto con efecto preventivo, curativo y anti-esporulante.

M-Metalaxil 2,85% + Hidróxido de cobre 21,5%, SC ES-00727

Boltex[®] F

Combinación fungicida con acción sinérgica y elevada actividad sistémica hacia nuevos crecimientos vegetativos.

M-Metalaxil 5% + Folpet 40%, WG ES-01125

Cairel[®]

Fungicida foliar con actividad preventiva y curativa de acción penetrante.

Dodina 40%, SC 23392

Candil[®]

Fungicida foliar de amplio espectro de acción. Actividad sistémica y movimiento translaminar.

Azoxistrobin 25%, SC ES-00268

Cardinal[®]

Fungicida sistémico de amplio espectro en frutales de pepita.

Ciprodinil 50%, WG ES-00313



Fungicidas

Conkora[®]

Fungicida penetrante de doble acción. Gran persistencia y amplio espectro de acción. Efecto sinérgico y acción polivalente.

Cimoxanilo 3% + Sulfato Cuprocálcico 22,5%, WP [ES-01026](#)

Cuper[®] 70 Flow

Cobre líquido de alta concentración en formulación flow. Gran adherencia y mayor resistencia al lavado.

Oxicloruro de Cobre 70%, SC [24465](#)

Cuprotec[®] 35 WG

Fungicida y bactericida de contacto con acción preventiva y formulación exclusiva. Certificado en agricultura ecológica.

Oxicloruro de Cobre 35%, WG [ES-00666](#)

Cultigo[®]

Innovador fungicida con actividad preventiva, curativa y antiesporulante, con un modo de acción único apropiado para incorporar en un programa anti resistencias.

Metrafenona 50% p/v (500 g/L) [ES-01541](#)



Cuprotec[®] F

Fungicida que ofrece una gran eficacia en el control del repilo del olivo, por su fuerte actividad de contacto multi-sitio.

Folpet 30% + Oxicloruro de cobre
16% (EXPR. EN CU) [WP] P/P

21506

Decibel[®] WG

Fungicida sistémico de acción traslaminar y notable efecto protector.

Kresoxim-metil 50%, WG

ES-00854

Eptilus[®] 40 SC

Fungicida sistémico, traslaminar y de contacto con actividad contra Botrytis cinerea.

Pirimetanil 40% SC

ES-01344

Daramun[®]

Fungicida de contacto con acción preventiva contra mildiu. Impide el desarrollo de todos los estados del ciclo biológico del mildiu desde la formación de los zoosporangios y germinación de las zoosporas hasta el crecimiento del micelio.

Ciazofamida 10% [SC] P/V

ES-01260

Droxicuper[®] 50

Fungicida en forma de polvo mojable, recomendado en el control preventivo de diversas enfermedades fúngicas y bacteriológicas en varios cultivos.

Hidróxido Cúprico 50%, WP

ES-01017

Etylfos[®] WG

Fungicida de sistemía completa. Muy eficaz contra hongos patógenos del género Phytophthora y Pythium.

Fosetil-AI 80%, WG

25505



Folpetis[®] 50 NEW

Fungicida polivalente de contacto con actividad preventiva y acción multi-sitio, registrado en cereales.

Folpet 50% SC

ES-01850

Mirlo[®] Max

Fungicida penetrante con acción traslaminar.

Cimoxanilo 45% WG

ES-00321

Orofrex[®] DP

Fungicida con acción preventiva, curativa y erradicante que actúa por contacto contra los hongos patógenos, y como acaricida para el control de una amplia variedad de ácaros.

Azufre 98.5%, DP

13325

Kantarel[®]

Fungicida anti-oidio de acción sistémica con acción preventiva y curativa durante el periodo de incubación del hongo.

Penconazol 10%, EC

24185

Navaron[®]

Fungicida de amplio espectro de acción (mildiu, oídio y excoriosis) con gran eficacia en aplicaciones preventivas.

Azoxistrobin 9,35%
Folpet 50%, SC

ES-00164

Sportaris[®]

Fungicida sistémico de reconocida eficacia frente a *Phytophthora* spp. y *Plasmopara viticola*.

Fosfonato potásico (expresado como ácido fosforoso): 51% p/v (510 g/l).

ES-00302

Fu



Spotter[®] WG

Fungicida sistémico con acción preventiva, curativa y erradicante, eficaz contra hongos ascomicetos.

Kresoxim-metil 25%
Difenoconazol 12,5%, WG

ES-00261

Tayiko[®]

Fungicida sistémico de amplio espectro con acción preventiva y curativa.

Difenoconazol 25%, EC

24561

Tayiko[®] 25 EC

Fungicida sistémico de amplio espectro de acción que detiene la enfermedad durante su periodo de incubación.

Difenoconazol 25%, EC

25951

Tresine[®] Max

Fungicida con acción sistémica y translaminar que destaca por su actividad preventiva, curativa y erradicante.

Azoxistrobin 20%
Tebuconazol 20%, SC

ES-01093



Wister[®] 25 WG

Fungicida sistémico contra oidio, moteado y monilia.

Tebuconazol 25%, WG

25092

Wister[®] 25 EW

Fungicida sistémico de doble acción.

Tebuconazol 25%, EW

24409

Zelora[®]

Fungicida de acción sistémica y acrópeta para el control de enfermedades como Fusarium y Roya.

Protioconazol 25%, EC

ES-01402

Veravit[®] Plus

Fungicida con acción de contacto y penetrante. Protección preventiva y curativa tanto para uva de mesa como vid de vinificación.

Cimoxanilo 8%, Folpet 66%, WG

ES-00259

Fu







Insecticidas

Conoce toda nuestra línea de productos para esta categoría.



Alazin[®]

Insecticida regulador del crecimiento (IGR) de contacto e ingestión.

Piriproxifen 10%, EC

24314

Atrapa[®]

Insecticida piretroide microencapsulado de alta eficacia con acción por contacto e ingestión.

Lambda cihalotrin 10%, CS

25637

Impulssor[®] Ultra Bio

Acaricida e insecticida de amplio espectro que se aplica mediante pulverización. Esta exento de LMR y con un bajo impacto ambiental.

Aceite de parafina 79%, EC

20036

Coraza[®] EC

Insecticida piretroide de última generación, eficaz, seguro y de confianza. Actúa por Contacto e Ingestión sobre las larvas y adultos sensibles.

Deltametrina 2,5%, EC

25706

Rister[®]

Insecticida granulado para el control de insectos del suelo.

Teflutrin 0.5%, GR

ES-01191



Insecticidas

Tiazosac[®]

Acaricida polivalente de contacto e ingestión con acción de choque de larga persistencia.

Hexitiazox 25,87%, SC

ES-00234

Sikori[®] Ultra

Insecticida que actúa por contacto e ingestión. Tiene una rápida acción de derribe (knock down) y prolongada acción residual.

Acetamiprid 20%

ES-00656

Arctise[®] 480 SC

Insecticida de origen natural con modo de acción único que actúa por contacto e ingestión.

Spinosad 48%

ES-01809

Sikori[®]

Insecticida sistémico con acción translaminar y actividad por contacto e ingestión.

Acetamiprid 20% SG

ES-00876







soteria[®]

BioProtection by Selectis Agro

Conoce toda nuestra línea de productos para esta categoría.

Etaria[®] **Bio**

Formulación 100% natural con efecto elicitor vegetal y barrera física y protectora. Imprescindible en programas de manejo de resistencias.

Clorhidrato de Quitosano 5% p/p (SC)

Vijay[®] **Bio**

Insecticida biológico y natural que actúa por ingestión provocando la parálisis intestinal de las orugas plaga.

Bacillus Thuringiensis 325 WP

22423

Equital[®] **Bio**

Sustancia básica que presenta un modo de acción preventivo por contacto en aplicaciones foliares.

Cola de caballo – Equisetum arvense

Prevam[®] Ultra **Bio**

Bioplaguicida de contacto con actividad insecticida, fungicida y acaricida y modo de acción físico.

Aceite de Naranja 6% (SL) P/V.

25761



soteria[®]

BioProtection by Selectis Agro

Vildigo Prays[®] **NEW**

Sistema de confusión sexual basado en feromonas para el control eficaz del prays del olivo y del prays del limón.

(Z)-7- Tetradecenal, 810 g/kg

ES-01911

Zolotin[®] **Bio**

Formulado 100% natural que causa daño directo en la pared celular del hongo. Óptimo en programas de manejo de resistencias.

Hidrógeno carbonato de Sodio 99% p/p (WP)

Volvega[®] **Bio**

Sustancia básica para el control en mezcla de ácaros y pulgones en cultivos frutales de hueso y pepita. Óptimo en programas de manejo de resistencias.

Extracto de Ortiga (Urtica spp) (=15 g/l)





Diversos

Conoce toda nuestra línea de productos para esta categoría.



Gibenina[®]

Fitorregulador a base de giberelinas y citoquininas.
Aumenta el peso del fruto en manzana.

6-Benziladenina 1,9%	24771
Giberelinas A4/A7 1,9%, SL	

Mojante[®] Trade 20

Formulación que incrementa el poder mojante de los caldos fitosanitarios y aumenta su persistencia.

Alquil Poliglicol (éter)	24477
20,0% p/v	



Guía por cultivo

Te presentamos las guías por cultivo.





Guía de tratamiento de cultivo de Patata



*Los periodos de aplicación son orientativos y que se recomienda consultar la hoja de registro de cada producto para una mayor precisión.

	 Plantación	 Emergencia / Germinación	 Desarrollo foliar 10-15 cm elongación de estolones	 Desarrollo foliar 20-40 cm formación del tubérculo	 Cierre de líneas / co- mienzo de la tuberización	 Desarrollo foliar completo / engrosa- miento del tubérculo	 Senescencia / Maduración
Mildiu					Boltex® C		
Alternaria				Sportaris®			
Alternaria y Mildiu				Mirlo® Max			
Escarabajos y gusanos grises		Atrapa®					
Orugas - pulgones escabarabajos		Coraza® EC					
Agriotes	Rister® O,5						
Malas hierbas de hoja ancha y estrecha	Admeto®	Rimsur®					
	Wildcard®						
Malas hierbas de hoja estrecha		Radar® Plus					
Coadyuvante	Mojante® Trade 20						


Guía de tratamiento de cultivo de Almendro



*Los periodos de aplicación son orientativos y que se recomienda consultar la hoja de registro de cada producto para una mayor precisión.

	 Parada vegetativa	 Hinchado de Yemas	 Floración	 Cuajado	 Fruto tamaño guisante	 Desarrollo del fruto	 Maduración	 Caída de hojas
Monilia - Moteado Oídio			Wister® 25 WG					
Abolladura Xanthomonas Cribado - Monilia Cladosporiosis Antracnosis Pseudomonas Phyophtora	Cuprotec® 35 WG							Cuprotec® 35 WG
	Cuper® 70 Flow							Cuper® 70 Flow
Moteado Mancha ocre			Spotter® WG					
Piojo de San José	Alazin®							
Cochinillas, pulgones y ácaros	Impulssor® Ultra							
Cigarrilla		Prevam® Ultra		Prevam® Ultra				
Pulgones - Orugas Anarsia - Orugueta Empoasca - Tigre Barrenillo Phylaenus Neophylaenus				Coraza® EC				
Cydia, Anarsia, Arañuelo, Oruga libreá, Viejecita, Orugas arrolladoras. Mono y dicotiledonas en pre emergencia o post temprana.			Vijay®					
	Bayasant® WG							Bayasant® WG
Malas hierbas Dicotiledóneas anuales en pre-emergencia y post-emergencia muy precoz	Inteike®							Inteike®
		Mamut®						Mamut®
		Catcher®						
Malas hierbas anuales y vivaces		Patter® Green 36						
Dicotiledóneas sensibles en post-emergencia		Hormotrade® 50						
Coadyuvante		Mojante® Trade 20						

Guía de tratamiento de cultivo de Cítricos



*Los periodos de aplicación son orientativos y que se recomienda consultar la hoja de registro de cada producto para una mayor precisión.

	 Yema Dormiente	 Brotación	 Inicio de Floración	 Plena Floración	 Cuajado	 Frutos en crecimiento	 Cambio de color	 Maduración	
Bacteriosis, Aguado Mal Seco, Fomopsis Hongos Endofitos							Cuper® 70 Flow		
Colletotrichum Negrilla Phytophthora Xanthomonas		Cuprotec® 35 WG							
Bacteriosis Phytophthora Enfermedades Fúngicas							Droxicuper® 50		
Phytophthora			Etylfos® WG			Etylfos® WG			
			Sportaris®						
Ácaros tetraquinicos Ácaro rojo	Tiazosac®								
Cochinillas Diaspinos	Alazin®								
Prays	Vildigo® Prays								
Cacoecia - Prays	Vijay®								
Cigarrilla			Prevam® Ultra					Prevam® Ultra	
Acaros, Cochinilla, Piojo, Trips, mosca blanca, mosca de la fruta, pulgones y Psila	Impulssor® Ultra								

Guía de tratamiento de cultivo de Cítricos



*Los periodos de aplicación son orientativos y que se recomienda consultar la hoja de registro de cada producto para una mayor precisión.

									
	Yema Dormiente	Brotación	Inicio de Floración	Plena Floración	Cuajado	Frutos en crecimiento	Cambio de color	Maduración	
Dicotiledóneas anuales	Mamut®								
Malas Hierbas Anuales	Inteike®						Inteike®		
Malas Hierbas Dicotiledóneas	Hormotrade® 50								
	Catcher®								
Gramíneas Anuales y Plurianuales, Junca Y Malas Hierbas Hoja Ancha	Bayasant® WG								Bayasant® WG
Malas Hierbas en Pre-Emergencia	Admeto®								
Malas Hierbas Gramíneas y Dicotiledóneas	Patter® Green 36								
Pulgón			Sikori® Ultra						
Coadyuvante	Mojante® Trade 20								

Guía de tratamiento de cultivo de Melocotón y Nectarina



*Los periodos de aplicación son orientativos y que se recomienda consultar la hoja de registro de cada producto para una mayor precisión.

									
	Yemas cerradas	Hinchado de yemas florales	Plena floración	Caída de pétalos	Cuajado fruto	Fruto crecimiento	Evolución maduración	Maduración cosecha	Parada vegetativa
Abolladura, Cribado, Monilia, Phytophthora, Xanthomonas	Cuprotec® 35 WG								
Abolladura, Monilia	Cuper® 70 Flow								
Abolladura	Equital®								
	Cairel®								
Oídio	Kantarel®								
	Prevam® Ultra								
	Azufril® MG								
Oídio y Monilia	Tayiko® 25 EC								
	Wister® 25 WG								
Piojo de San Jose	Alazin®								
Pulgones	Sikori®								
	Volvega®								
Áfidos, Chinchas, Espumadora, Ácaros, Cochinitas, Ácaros, Orugas. Mono y dicotiledonas en pre emergencia o post temprana.	Coraza® EC			Coraza® EC					
	Impulssor® Ultra			Impulssor® Ultra					
	Azufril® MG								
	Vijay®								
	Arctise® 480 SC								
	Bayasant® WG								
Malas Hierbas	Admeto®								
	Inteike®								
	Radar®								
	Mamut®								
	Patter® Green 36								
	Hormotrade® 50								
Coadyuvante	Mojante® Trade 20								

Guía de tratamiento de cultivo de Tomate de Industria



*Los periodos de aplicación son orientativos y que se recomienda consultar la hoja de registro de cada producto para una mayor precisión.

	 Trasplante	 Desarrollo Vegetativo	 Floración	 Cuajado	 Maduración
Oídio				Azufril® MG	
Oídio Y Oidiopsis			Prevam® Ultra	Orofrex® DP	
Oidiopsis				Kantarel®	
Alternaria, Botritis Y Esclerotinia				Cultigo®	
Mildiu, Alternaria, Antacnosis, Bacteriosis			Candil®		
Mildiu, Alternaria		Conkora®		Tayiko® 25 EC	
Alternaria, Antacnosis, Bacteriosis		Droxicuper® 50		Cuper® 70 Flow	Droxicuper® 50
Antimildiu Penetrante		Conkora®			
Alternaria				Tayiko®	
Mildiu			Boltex® C		
Botritis, Cladoporiosis, Oídio				Wister® 25 WG	
Gusanos grises, Mosca Blanca, Orugas				Atrapa®	
Lepidopteros, Noctuidos y Pulgones				Coraza® EC	
Lepidópteros				Vijay®	
Malas Hierbas	Admeto®				
		Radar®			
		Rimsur®			

Guía de tratamiento de cultivo de Olivar



*Los periodos de aplicación son orientativos y que se recomienda consultar la hoja de registro de cada producto para una mayor precisión.

								
	Salida Del Invierno	Brotación Desarrollo Vegetativo	Prefloración Floración	Plena Floración	Cuajado Desarrollo Del Fruto	Envero	Maduración	Reposo Invernal
Repilo		Droxicuper® 50 Wister® 25 EW Spotter® WG Decibel® WG Sportaris® Cuprotec® F				Droxicuper® 50		
Repilo y Antracnosis		Cuper® 70 Flow				Cuper® 70 Flow		
Repilo Negrilla Cladosporiosis Pseudomonas		Cairel® Cuprotec® 35 WG				Cairel® Cuprotec® 35 WG		
Prays		Atrapa® Vildigo Prays®						
Prays Barrenillo Mosca Del Olivo Philaneus Spumarius			Vijay® Coraza® EC			Coraza® EC		
Malas Hierbas De Hoja Estrecha Y Ancha		Bayasant® WG Inteike® Mamut® Patter® Green 36 Catcher®					Bayasant® WG Inteike® Mamut®	
Malas Hierbas Complicadas Dicotiledóneas y Gramíneas anuales y plu-rianales.		Bayasant® WG Bayasant® Duo					Bayasant® WG	Bayasant® Duo

Guía de tratamiento de cultivo de la vid de vinificación



*Los periodos de aplicación son orientativos y que se recomienda consultar la hoja de registro de cada producto para una mayor precisión.

									
	Hinchado yemas	Salida hojas	Pre-floración	Floración	Cuajado fruto	Cierre racimos	Envero	Maduración	Post-cosecha
Excoriosis	Navaron®								
Mildiu, Excoriosis y Black Rot		Cuprotec® 35 WG			Cuprotec® 35 WG				
Mildiu			Sportaris®						
			Navaron®						
			Etylfos® WG						
			Veravit® Plus WG						
			Boltex® F						
			Daramun®						
			Mirlo® Max						
		Prevam® Ultra				Prevam® Ultra			
			Equital®						
	Oídio		Prevam® Ultra				Prevam® Ultra		
			Zolotin®						
			Kantarel®						
			Decibel® WG						
			Azufril® MG						
			Orofrex® DP						
			Wister® 25 WG						
			Navaron®						
			Cultigo®						
Oídio/Brenner				Tayiko® 25 EC					
Black-rot			Decibel® WG						
Botritis					Etaria®				

Guía de tratamiento de cultivo de la vid de vinificación



*Los periodos de aplicación son orientativos y que se recomienda consultar la hoja de registro de cada producto para una mayor precisión.

											
	Parada Vegetativa	Hinchado yemas	Salida hojas	Pre-floración	Floración	Cuajado fruto	Cierre racimos	Envero	Maduración	Post-cosecha	
Ácaros			Azufril® MG								
			Tiazosac®								
Polilla del racimo Mosquito verde		Coraza® EC				Coraza® EC					
Polilla del racimo Mosquito verde			Arctise® 480 SC								
Malas Hierbas		Inteike®									
		Mamut®									
		Bayasant® WG									
		Patter® Green 36									
			Radar®								
Coadyuvante		Mojante® Trade 20									
Mildiu Excoriosis Black-rot		Cuprotec® 35 WG					Cuprotec® 35 WG				
Mildiu		Prevam® Ultra					Prevam® Ultra				
			Equital®								
Oídio		Prevam® Ultra					Prevam® Ultra				
			Zolotin®								
			Azufril® MG								
			Orofrex® DP								
Botritis							Etaria®				
Polilla del racimo			Vijay®								


Guía de tratamiento de cultivo de la uva de mesa



Los periodos de aplicación son orientativos y que se recomienda consultar la hoja de registro de cada producto para una mayor precisión.

									
	Hinchado yemas	Salida hojas	Pre-floración	Floración	Cuajado fruto	Cierre racimos	Envero	Maduración	Post-cosecha
Excoriosis	Navaron®								
Mildiu, Excoriosis y Black Rot	Cuprotec® 35 WG			Cuprotec® 35 WG					
Mildiu	Sportaris®			Navaron®			Etylfos® WG		
	Veravit® Plus WG			Boltex® F			Daramun®		
	Mirlo® Max			Prevam® Ultra			Prevam® Ultra		
	Equital®			Prevam® Ultra			Prevam® Ultra		
	Kantarel®			Decibel® WG			Azufril® MG		
	Orofrex® DP			Wister® 25 WG			Navaron®		
	Cultigo®			Tayiko® 25 EC			Decibel® WG		
	Oídio/Brenner			Decibel® WG			Etaria®		
	Black-rot			Etaria®					
	Botritis								

Guía de tratamiento de cultivo de la uva de mesa



*Los períodos de aplicación son orientativos y que se recomienda consultar la hoja de registro de cada producto para una mayor precisión.

										
	Hinchado yemas	Salida hojas	Pre-floración	Floración	Cuajado fruto	Cierre racimos	Envero	Maduración	Post-cosecha	
Ácaros		Azufril® MG								
		Tiazosac®								
Polilla del racimo Mosquito verde		Coraza® EC			Coraza® EC					
Trips y Polilla del racimo		Arctise® 480 SC								
Malas Hierbas		Inteike®								
		Mamut®								
		Bayasant® WG								
		Patter® Green 36								
		Admeto®								
		Radar®								
Coadyuvante		Mojante® Trade 20								

Guía de tratamiento de cultivo de Lechuga



*Los periodos de aplicación son orientativos y que se recomienda consultar la hoja de registro de cada producto para una mayor precisión.

	 Pretransplante	 Transplante	 3 hojas verdaderas	 Comienzo del desarrollo de la cabeza	 Cabeza al 50%
Malas hierbas	Admeto[®]				
Pulgón		Atrapa[®]			
Alternaria, Bremia, Cercospora, Colletotricum, Peronospora, Pseudomonas y Xanthomonas		Cuprotec[®] 35 WG			
Botrytis y Sclerotinia		Eptilus[®] 40 SC			
Mosca blanca y Oídio		Prevam[®] Ultra			
Plusia, Rosquilla y Helicoverpa		Vijay[®]			
Trips, Frankliniella occidentalis y Lepidópteros.		Arctise[®] 480 SC			
Mildiu y Bremia		Sportaris[®]			
Coadyuvante		Mojante[®] Trade 20			

Guía de tratamiento de cultivo de Pimiento



*Los periodos de aplicación son orientativos y que se recomienda consultar la hoja de registro de cada producto para una mayor precisión.

	 Pre transplante	 Transplante	 Desarrollo vegetativo	 Floración	 Cuajado	 Desarrollo de Fruto	 Maduración
Malas hierbas	Admeto[®]						
Mosca blanca		Atrapa[®]					
Oídio, Ácaros		Azufril[®] MG					
Botrytis				Eptilus[®] 40 SC			
Mosca blanca		Prevam[®] Ultra					
Helicoverpa, Plusia, Rosquilla		Vijay[®]					
Cladosporiosis, Oídio		Wister[®] 25 WG					
Helicoverpa ssp, Rosquilla negra, Tuta absoluta y Trips, <i>Frankliniella occidentalis</i>		Arctise[®] 480 SC					
Mildiu			Sportaris[®]				
Oídio (solo invernadero)		Cultigo[®]					
Coadyuvante	Mojante[®] Trade 20						

Guía de tratamiento de cultivo de Tomate de Invernadero



*Los periodos de aplicación son orientativos y que se recomienda consultar la hoja de registro de cada producto para una mayor precisión.

							
	Pre transplante	Establecimiento	Desarrollo y crecimiento Vegetativo	Primera Floración y cuajado	Primera fase de desarrollo de fruto	Inicio Cosecha	Plena Cosecha
Malas hierbas de hoja ancha y estrecha	Admeto [®]						
Mosca blanca				Alazin [®]			
Oídio				Prevam [®] Ultra			
Phytophthora				Azufril [®] MG			
Pulgones, Lepidóptero y Chinche				Candil [®]			
Mildiu				Kantarel [®]			
Botrytis				Boltex [®] C			
Ácaros y oídio				Coraza [®] EC			
Coadyuvante				Daramun [®]			
Malas hierbas				Droxicuper [®] 50	Droxicuper [®] 50		
Alternaria, Esclerotinia y Podredumbre				Mirlo [®] Max			
Plusia, Helicoverpa, Tuta y Rosquilla				Eptilus [®] 40 SC			
Oídio				Orofrex [®] DP			
Mildiu				Mojante [®] Trade 20			
Helicoverpa ssp y Rosquilla				Rimsur [®]			
				Tayiko [®] 25 EC			
				Vijay [®]			
				Wister [®] 25 WG			
				Cultigo [®]			
				Sportaris [®]			
				Arctise [®] 480 SC			

Guía de tratamiento de cultivo de Cereal

*Los periodos de aplicación son orientativos y que se recomienda consultar la hoja de registro de cada producto para una mayor precisión.



Siembra

Germinación

1 Hoja

2 Hojas

3 Hojas

Comienzo Ahijamiento

Ahijamiento

Final Ahijamiento

Encañado

Dicotiledóneas y monocotiledóneas anuales

Pearly[®] 80

Mamut[®]

Admeto[®]

Mamut[®]

Dicotiledóneas anuales

Mamut[®] Max

Overstar[®]

Catcher[®]

Hormotrade[®] 50

Oteador[®]

Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha, gramíneas anuales y plurianuales

Moory[®]

Moory[®]

Oídio, Helminthosporiosis (Pyrenophora teres), Rincosporium, Roya y Septoria

Wister[®] 25 EW

Fusarium, Septoria, Roya, Helminthosporiosis, Rincosporium

Tresine[®] Max

Oídio, raya amarilla y parda, septoriosis y podredumbre radicular (Fusarium roseum)

Candil[®]

Roya, Fusarium, Rincosporium, Septoria, Helminthosporium

Zelora[®]

Septoria y Helminthosporium

Folpetis[®] 50

Áfidos y pulgones

Atrapa[®]

Áfidos, pulgones (aphididae, nephasia pumicana)

Coraza[®] EC

Coadyuvante

Mojante[®] Trade 20

Guía de tratamiento de cultivo de Frutal de Pepita (Manzano y Peral)



*Los periodos de aplicación son orientativos y que se recomienda consultar la hoja de registro de cada producto para una mayor precisión.

										
	Letargo invernal	Yemas hinchadas	Inicio floración	Plena floración	Cuajado de fruto	Crecimiento fruto	Inicio maduración	Maduración	Otoño	Caída de hojas
Malas hierbas	Admeto[®]									
Malas hierbas de hoja ancha	Catcher[®]								Catcher[®]	
	Hormotrade[®] 50									
Mono y dicotiledonas en pre emergencia o post temprana	Bayasant[®] WG									Bayasant[®] WG
Monocotiledóneas y dicotiledóneas	Inteike[®]									Inteike[®]
	Patter[®] Green 36									
Dicotiledóneas anuales	Mamut[®]									
Gramíneas	Radar[®]									
Psila, Ácaros, cochinilla	Impulssor[®] Ultra									
Piojo de san José	Alazin[®]									
Carpocapsa, Mosca de la fruta		Atrapa[®]								
Carpocapsa, Chinchas, Áfidos		Coraza[®] EC								
Pulgones	Sikori[®]					Sikori[®]				
Ácaros	Tiazosac[®]									
	Azufril[®] MG									
Carpocapsa	Vijay[®]									
					Arctise[®] 480 SC					

Guía de tratamiento de cultivo de Frutal de Pepita (Manzano y Peral)




*Los periodos de aplicación son orientativos y que se recomienda consultar la hoja de registro de cada producto para una mayor precisión.

										
	Letargo invernal	Yemas hinchadas	Inicio floración	Plena floración	Cuajado de fruto	Crecimiento fruto	Inicio maduración	Maduración	Otoño	Caída de hojas
Oídio	Azufril® MG									
	Kantarel®									
	Cairel®									
Moteado										
	Tayiko® 25 EC									
						Sportaris®				
Moteado, Stemphyllium, Oídio	Decibel® WG									
					Wister® 25 WG					
Phytophthora						Etyfos® WG				
Moteado, Stemphyllium	Spotter® WG									
Septoria	Cuprotec® 35 WG									
Reducir russeting (solo manzano)					Gibenina®					
Coadyuvante	Mojante® Trade 20									
	Cuper® 70 Flow									

Guía de tratamiento de cultivo de Maíz



*Los periodos de aplicación son orientativos y que se recomienda consultar la hoja de registro de cada producto para una mayor precisión.

				
	Pre - siembra	Pre - emergencia	Post - emergencia temprana	Post - emergencia
Monocotiledóneas y dicotiledóneas anuales y plurianuales	Patter® Green 36			
Malas hierbas anuales	Admeto®			
Monocotiledóneas y dicotiledóneas	Sulcotrina®			
Malas hierbas	Rimsur®			
	Extensor® OD			
Monocotiledóneas y dicotiledóneas anuales	Zeatryn®			
	Catcher®			
Dicotiledóneas	Gal-Gone®			
	Hormotrade® 50			
	Bentador®			
Dicotiledóneas y monocotiledóneas anuales	Nicozea®			
Coadyuvante	Mojante® Trade 20			





selectis



AQUÍ A MANO